

贵州夏管气象服务周报

2025 年

第 21 周

NO.21

贵州省生态与农业气象中心 签发：古书鸿 邹军

审核：胡家敏

贵州省农作物技术推广总站 制作：罗楠 徐永灵 曾涛 王沁 2025 年 5 月 23 日

未来一周仍有强降雨过程 灾区需抢时开展灾后生产恢复

一、过去一周农业气象条件特点

过去一周，省之中部偏北、西北大部、西南部大部降水在 50 毫米以上（图 1），与常年相比，省之东北部、东南部地区偏少 3 成~1 倍（锦屏），其余地区正常~偏多 4.7 倍（息烽）（图 2）。16 日、20 日至 22 日我省出现强降雨和强对流天气，册亨、安龙、大方、汇川等地区日降水量超过 200 毫米；盘州、七星关、赫章、习水、惠水、兴仁等 12 个县（市、区）境内出现冰雹，最大直径为盘州市 10 毫米。局地出现农田洪涝，部分作物受淹。




图 1 降水量分布



图 2 降水距平百分率分布

二、未来一周天气对农业生产影响预估

据省气象台预报：预计未来一周，我省晴雨相间，但 27 日前后仍有一次较强降水过程，主要集中在省的中东部

及南部，雨量达暴雨，部分乡镇达大暴雨，其余时段多阵雨或雷雨天气，总体有利于遵义市、毕节市等受灾地区开展灾后生产恢复，各地需抢抓非强降雨时段及时开展田间管理，促进作物恢复生长。




图3 未来一周降水量预报图

三、农事建议

(一) 水稻

1.秧田管理。当前全省水稻正值移栽关键时期，强降雨易导致洼地、湾地的秧苗遭受短时渍、涝灾害影响。受灾后，要及时排除田间积水，先让稻株顶部露出水面，晴日分次排水，保留适当水层；阴雨天可将水一次性排干，轻露田，促进恢复和延长叶片功能期。

2.适时追肥。移栽在田的秧苗在排干水轻露田后，补施分蘖肥，根据品种的抗倒性、田块肥力及其苗情决定，一般以氮肥为主每亩可追尿素 10 公斤左右。

3.病虫害防治。由于叶片损伤，易感纹枯病、稻瘟病、细条病等病害，要及时用药防治。纹枯病防治指标为病丛率 20%以上，亩用 30%爱苗乳油 15 毫升兑水 50 公斤均匀喷雾。

（二）玉米

1.中耕防倒伏。水涝易造成玉米倒伏，择能下地时间选择中耕培土的方式提高玉米植株的抗倒伏能力，若已出现倒伏的玉米植株，需在 48 小时内扶起植株并进行中耕培土，促进玉米恢复生长，减少倒伏造成的负面影响。

2.适时追肥。玉米受涝会出现叶黄、秆红等脱肥现象，择雨停的时期及时进行追肥，主要以增施速效氮肥为主，亩施 5-10 公斤/亩，达到及时补充玉米营养。

3.病虫害防控。多雨后易多发高温天气，高温高湿情况下，病虫害一般会发生偏重，需做好草地贪夜蛾、玉米螟、粘虫、纹枯病、南方锈病等病虫害的防治。

（三）油菜

1.收获。当前油菜处于完熟期，雨后及时清理沟渠，抢排积水，降低土壤湿度，为后续的机械抢收或人工抢收创造条件。优先收割倒伏或荚果裂开的植株。若土壤过湿无法进行机械收获，改用人工收割；或待天气晴稳后采用履带式收割机收割。

2.保存。收割后及时摊晾于通风处，待荚果干燥后及时脱粒，有条件的地方可以使用烘干设施或应急风干设施处理，避免堆沤发芽发霉。若籽粒已发芽，需分离发芽籽粒，避免混入正常籽粒影响品质。

（四）及时改种

作物被彻底雨水冲刷损毁严重的地块，需及时进行改种。