

农业气象灾害监测评估

2024 年 第 11 期 NO.11

贵州省生态与农业气象中心

签发：左 晋

2024年6月18日

持续性强降水 南部、东部需加强防范湿渍害

摘要：16 日 20 时至 18 日 08 时，我省降水量为 0~237.8 毫米（榕江岑套）。省的东部、南部、西南部局地出现中至重度湿渍害，对辣椒、大豆、蔬菜等作物根系生长不利，利于农作物病虫害进一步发展，蜂糖李等即将成熟水果裂果风险极高。未来 24 小时，暴雨以上落区主要分布在省的西南部，需及时采摘已成熟的蜂糖李、蓝莓等水果，以防裂果，田间及时开沟排水并加强病虫害监测防治。

一、农田湿渍害监测

16 日 20 时至 18 日 08 时，我省降水量为 0~237.8 毫米（榕江岑套），其中播州、桐梓、绥阳、松桃、江口、黎平、榕江、从江、瓮安、荔波、长顺、惠水、赫章等县部分乡镇累计雨量超过 100 毫米，局地超过 200 毫米，铜仁市东部、黔东南州东北部、黔南州南部、贵阳市南部、六盘水市东北部等部分乡镇出现中级以上湿渍害，影响玉米、辣椒、大豆等在地作物根系生长，水果出现裂果等现象。




图 1 2024 年 6 月 16 日-18 日降雨量分布图




图 2 2024 年 6 月 18 日 20 厘米土壤相对湿度、17 日农田湿渍害监测分布图

二、未来 24 小时预警

未来 24 小时，我省仍有较大降雨，雨量在中到大雨，局地暴雨，暴雨落区主要分布在省的西南和东南部。铜仁、黔东南、黔南、贵阳、黔西南、安顺、六盘水等市州部分乡镇湿渍害风险高，将持续影响在田作物根系生长，水果裂果、落果风险高。




图3 2024年6月18日至19日降雨落区预报及农田湿渍害风险分布图

三、防御措施

- 1.要及时清沟理渠防积水；雨后组织中耕松土防止土壤板结，并结合苗情喷施叶面肥促进作物恢复生长；
- 2.加强病虫害防治工作，抢抓降雨间隙及时开展防治工作；
- 3.及时收获已成熟的蜂糖李、蓝莓等水果，以防水果裂果。

制作：陈中云 谭文

审核：胡家敏

报送：贵州省农业农村厅、贵州省气象局、贵州省统计局、国家统计局贵州调查总队领导和相关处室

抄送：各直属单位、各市州气象局等单位